



لیکونوفی ۶-۶-۶

دستورالعمل مصرف:

استفاده همراه با آب آبیاری: در سیستم آبیاری تحت فشار (آبیاری بارانی و قطره ای) و آبیاری سطحی قابل استفاده می باشد که مطابق جدول زیر قابل توصیه است.

تجزیه های ضمانت شده

نیتروژن کل (N)	۶ درصد (W/W)
فسفر قابل استفاده (P_2O_5)	۶ درصد (W/W)
پتاسیم محلول در آب (K_2O)	۶ درصد (W/W)
منیزیم محلول (Mg)	۱ / ۵ درصد (W/W)
کلسیم محلول (Ca)	۳ / ۵۰ درصد (W/W)
آهن محلول (Fe)	۲ / ۵۰ درصد (W/W)
روی محلول (Zn)	۵ / ۲۵ درصد (W/W)
منگنز محلول (Mn)	۵ / ۲۵ درصد (W/W)
هیومیک اسید	۵ / ۳ درصد (W/W)
کربن آلی (OC)	۴ درصد (W/W)

ترکیبات سازنده: سولفات آمونیوم، سولفات پتاسیم، اسید فسفریک هیومات پتاسیم، سولفات منیزیم، سولفات آهن، سولفات روی، سولفات منگنز، ماده آلی

حجم خالص: ۲۰،۵،۱ لیتر

محصولی از شرکت حاصل خیزان شمال
آدرس کارخانه: مازندران، بابلسر، بالا احمدکلا، جنب تصفیه خانه
تلفن: ۰۱۱ - ۳۲۳۵۰۰۷۵
فکس: ۰۲۱ - ۸۹۷۷۰۶۷۸
همراه: ۰۹۱۳۸۸۹۵۵۸۵
شماره پروانه بهره برداری: ۷۰۱/۷۰۳۳۳
شماره ثبت ماده کودی: ۶۹۶۱۱

سری ساخت:
تاریخ تولید:
تاریخ انقضاء: یک سال پس از تولید
ساخت ایران

محصول	مقدار مصرف (لیتر در هکتار)	زمان مصرف با آب آبیاری
پسته	۳۵ - ۴۵	پس از گلدهی تا اواخر فصل رشد
درختان میوه (سیب، هلو، گردو، خرما و ...)	۳۰ - ۴۰	پس از گلدهی تا اواخر فصل رشد
غلات (برنج، گندم، جو و ...)	۱۰ - ۲۰	پس از زمان پنجه زنی تا زمان گلدهی با آب آبیاری
مرکبات	۳۰ - ۴۰	پس از گلدهی تا اواخر فصل رشد
سیب زمینی، گوجه فرنگی و هندوانه	۲۰ - ۳۰	از زمان نشا شدن تا زمان گلدهی
ذرت	۲۵ - ۳۵	از زمان سه برگی شدن تا تشکیل گل آذین نر
دانه های روغنی	۲۰ - ۳۰	یک ماه بعد از کاشت تا زمان گلدهی
سبزی و صیفی جات	۲۰ - ۳۰	بعد از نشا تا زمان گلدهی
توت فرنگی	۲۵ - ۳۵	بعد از نشا تا زمان گلدهی
چغندر قند	۲۰ - ۲۵	یک ماه بعد از کاشت تا زمان گلدهی
زعفران	۲۰ - ۲۵	اوایل دوره رشد تا قبل از گلدهی
کشت های گلخانه ای	۱ - ۲ لیتر در هزار متر مربع	در طول دوره رشد

توجه:

- برای مشاهده بهترین نتیجه توصیه می شود حداقل ۳ بار در طول فصل رشد از لیکونوفی استفاده شود.
- مقادیر پیشنهاد شده در جدول فوق برای خاک های با میزان باروری متوسط پیشنهاد می شود. در غیر این صورت با توجه به آنالیز شیمیایی خاک مزرعه و با توجه به نوع و سن گیاه و نظر کارشناس از این کود استفاده نمایید.
- قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.
- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
- خصوصیات:
 - افزایش بازده رشد و عملکرد محصول
 - افزایش قابلیت دسترسی عناصر در خاک
 - فعال کننده میکروارگانیزم های مفید خاک