

Balancer

تجزیه ضمانت شده :

w/w ۹٪

بر محلول (B)

w/w ۰/۰۰۵٪

مولیبیدن محلول (Mo)

ترکیبات سازنده : سدیم بورات — مولیبدات آمونیوم

GENERAL INFORMATION

Balancer contains boron and molybdenum which function in plants to:

- Move carbohydrates out of the leaves to the roots, storage tissue, seeds or fruit
- Reduce excessive vegetative growth.
- Prepare crops for harvest.
- Maintain hormone balance in a crop that use high levels of nitrogen.
- Increase fruit, seed and storage tissue uniformity... uniform sizing.

Balancer promote nitrogen balance in two ways:

1. Boron enhances nitrogen utilization by improving sugar transport and metabolism, auxin metabolism and seed and fruit development.
2. Molybdenum is essential for the initial conversion of nitrate nitrogen into nitrogen forms that contribute to higher yields rather than rank growth.

Balancer is a convenient, effective soluble boron source with the added benefit of molybdenum to promote conversion of nitrate nitrogen into more metabolically functional forms.

در صورت نیاز به رشد بیشتر ،میزان بیشتری از ترکیب (حد بالاتر) را بکاربیرید. در شرایط رشدی نرمال، حد پایین تر ترکیب را استفاده نمایند و در هر ۱۴ روز یکبار آنرا تکرار کنید. زمان شروع کاربرد ترکیب، از ابتدای مرحله گل دهی است و یا ابتدای تشکیل اندامهای ذخیره ای مثل ریشه یا غده.

آماده شدن محصول برای برداشت:

به منظور تحریک گیاه به حرکت قندها از برگ ها به سمت اندام های ذخیره ای (میوه ها ، دانه ، غده و ریشه های ذخیره ای) با پستی سطح بعضی از هورمونها در گیاه کاهش یابد. استفاده از بالانسر زمانی مفید و کارایی بالایی دارد که گیاه وارد مرحله برداشت نشده باشد.

– شماره ثبت ماده کودی : ۸۰۱۴۴

– شرکت تامین کننده: Stoller Turkey organik Tarım sanayi ticaret anonim şirketi

– کشور تامین کننده: ترکیه

– شرکت وارد کننده: شرکت مهر گستر سوزمین سپز، شیراز، بلوار چمران، خیابان چوگیا،

نبش کوچه ۲۵، پلاک ۳۱۵ – کدپستی: ۷۱۹۴۸-۹۳۶۶۶ telfax: +۹۸۷۱-۳۶۴۴۵۳۶

Prod. date: تاریخ تولید: درج شده روی محصول

Exp. date: تاریخ انقضاء: درج شده روی محصول

Net content: حجم خالص: ۱ و ۵ و ۱۰ و ۲۰ لیتر

Batch No : شماره بچ:

A MICRONUTRIENT SUPPLEMENT FOR FOLIAR AND SOIL APPLICATION

BALANCER



Stoller®

دستور العمل مصرف:

نوع محصول	میزان مصرف	زمان مصرف	نحوه مصرف	تکرار
کدوئیان، حبوبات بادمجان، گوجه فرنگی قلقل و توت فرنگی	دُر ۳-۲ در هزار	پس از تشکیل میوه	محلول پاشی	هر ۳-۲ هفته تکرار تا پایان برداشت
* درختان میوه هسته دار و دانه دار	دُر ۳-۲ در هزار	یک ماه قبل از برداشت یک ماه قبل از ریزش برگ ها	محلول پاشی	۲ هفته بعد
مرکبات	دُر ۲ در هزار	میوه نخودی	محلول پاشی	هر یک ماه تکرار تا زمان کامل شدن اندازه میوه
برنج	۱ لیتر در هکتار	خمیری و شیری بودن خوشه	محلول پاشی	–
گندم	۲ لیتر در هکتار	خمیری و شیری بودن خوشه	محلول پاشی	–
نیشکر	۲-۳ لیتر در هکتار	۳۰ تا ۴۰ روز قبل از برداشت	محلول پاشی	–
چغندر قند	۲-۳ لیتر در هکتار	۲ تا ۴ ماه قبل از برداشت	محلول پاشی	–
کلزا	۱/۵ لیتر در هکتار	۳۰ تا ۴۰ روز قبل از برداشت	محلول پاشی	–
سیب زمینی و پیاز	۲/۵ لیتر در هکتار	۳۰ تا ۴۰ روز قبل از برداشت	محلول پاشی	–
	۳ لیتر در هکتار	همراه با آب آبیاری		
خریزه و هندوانه	۲ لیتر در هکتار	۲۰ تا ۳۰ روز قبل از برداشت	محلول پاشی	–
	۲-۳ لیتر در هکتار	همراه با آب آبیاری		

توجه: چنانچه از بالانسر استفاده می کنید گیاه نیازی به بر نخواهد داشت.

«روش مخلوط سازی»

بالانسر قابل اختلاط با بیشتر مواد شیمیایی کشاورزی است.

هشدار:

در صورت تنفس، شخص مصدوم را در هوای آزاد ببرید. اگر تنفس مشکل شده، تنفس از طریق دهان به دهان توصیه می شود. اگر محلول وارد چشم شد، چشم را با مقدار مناسب آب تمییز، بشوئید. در صورت تماس با پوست، پوست را با آب و صابون بشوئید. در صورت بروز حساسیت و سوزش از داروهای موضعی استفاده شود. چنانچه لباسهایتان با محلول آغشته شد آنرا سریعاً در آورید و آنرا با آب گرم و مواد شوینده بشوئید.

هشدارهای زیست محیطی: محلول را در آبهای جاری نریزید. آنها را آلوده نسازید.

احتیاط و هشدار:

دور از دسترسی اطفال نگهداری شود
قبل از مصرف دستور العمل مصرف به دقت مطالعه شود