

ب) ۵ روز قبل از گل و ۱۵ روز بعد از گل ۸۰ کیلوگرم در ۱۰۰۰.
 پ) ۲۰ روز قبل از تشکیل خوشه تا ۲۰ روز بعد از تشکیل خوشه
 ۸۰ کیلوگرم در ۱۰۰۰
 ۶) روش گرده پاشی در گلخانه ها:
 الف) هنگام رشد و در طول باردی هر سه هفته یکبار
 - مقدار مصرف: بصورتیکه گرده زركوه لایه بسیار نازکی روی
 سطح برگ و ساقه ایجاد نماید.
 - زمان مصرف: فقط روزها.

خواص گوگرد معدن زركوه:

- ۱- خنثی نمودن آهک "نمک" شوری و قلیائیت خاک.
- ۲- جذب از طریق برگ و ریشه
- ۳- دارای سولفات گوگرد (SO4)
- ۴- اسیدی نمودن بستر خاک
- ۶- پایین آوردن PH و EC خاک و کودهای حیوانی
- ۷- بهبود خاک
- ۸- تقویت درختان و گیاهان
- ۹- سرعت جذب غذا توسط ریشه ها
- ۱۰- افزایش مقدار جذب غذا توسط ریشه ها
- ۱۱- آسان نمودن حرکت ریشه ها در خاک
- ۱۲- افزایش سطح تهویه و نیتروژن در خاک
- ۱۳- افزایش جذب رطوبت در خاک
- ۱۴- حفظ رطوبت طولانی مدت در خاک
- ۱۵- افزایش محصول
- ۱۶- جلوگیری از آفتاب سوختگی سطح پوست میوه انار و دیگر میوه ها
- ۱۷- جلوگیری از آفتاب سوختگی و گرما زدگی درختان و گیاهان در تابستان
- ۱۸- پوساندن "غنی نمودن و فرآوری ۲۰ روزه کودهای حیوانی"

گواهینامه ها و مجوزات رسمی:

- ۱- شماره پروانه بهره برداری: ۳۵۹۸۷/۱۲۳
- ۲- شماره ثبت ماده کودی:
- ۳- شماره های گواهینامه ارگانیک:

BC-COM10207
 BC140417085P01

احتیاط و هشدار:

- ۱- دور از دسترس اطفال "تابش مستقیم نور آفتاب" آب و رطوبت نگهداری شود.
 - ۲- قبل از استفاده دستورالعملهای استفاده با دقت مطالعه گردد.
 - ۵- عواقب عدم توجه به نکات فوق که منجر به خسارات گردد به عهده خریدار و مصرف کننده آن میباشد.
 - سری ساخت: بهمن ماه ۱۳۹۹
 - تاریخ تولید: بهمن ماه ۱۳۹۹
 - تاریخ انقضاء: اسفند ماه ۱۴۰۴
 - شرکت تولید کننده: شیمی گستر رضوان
 - آدرس کارخانه: گرمسار - ناحیه صنعتی سید آباد - انتهای اولین کوچه -
 - کد پستی: ۳۵۸۹۱۱۷۱۱۲۸
 - شماره های تماس:
 - ۰۲۳۳۴۲۰۵۹۰۶ - ۴۳۲۴ - ۱۱۰ - ۰۹۱۲
 - وزن خالص ۲۵ کیلوگرم + - ۱۰۰ گرم
 - آدرس سایت گوگرد معدن زركوه:
- googerd-zarkooh.com
 googerd-zarkooh.ir

«گوگرد معدن زركوه»

- ◆ بهبود خاکهای آهکی "شور و قلیائی
- ◆ تقویت و تغذیه درختان "گیاهان" زراعت "شالیزار" غلات و ... از طریق برگ "ساقه و ریشه
- ◆ تقویت خاک
- تجزیه ضمانت شده:
- گوگرد محلول % (SO3) ۱۲
- گوگرد عنصری % (S) ۱۵
- گوگرد کل (S) % ۲۰
- ماده آلی % (OM) ۱۲
- ◆ ترکیبات سازنده:
- گوگرد معدنی - ماده آلی
- ◆ دستورالعمل استفاده:

- ۱) برای تقویت و بهبود خاک در باغات:
- الف) مقدار ۲ الی ۳ تن در هکتار برای کلیه درختان
- ب) زمان مصرف: در هر ۱۲ ماه سال قابلیت مصرف دارد (حتی در فصل تابستان و در اوج گرما
- ب) روش مصرف:
- ۱- پخش بصورت روپاش بر روی سطح خاک در قسمت سایه انداز هر درخت سپس با خاک مخلوط گردد.
- ۲- همراه با آب آبیاری اعم از سیستمی تحت فشار و یا غرق آبی
- ۳- مصرف به روش چالکود.
- ۲) تقویت خاک و بهبود خاک زمینهای کشاورزی "زراعی" صیفی جات "جالیزها و سبزیجات:
- الف) ۶۰۰ کیلوگرم الی ۱۰۰۰ کیلوگرم برای (یک هکتار) در یک دوره کامل کاشت داشت برداشت
- ب) بعد از عملیات شخم (گاواهن) تا یک هفته قبل از برداشت محصول میتوانید استفاده نمایید.
- پ) میتوانید همراه با کاشت بذر توسط دستگاه های ردیف کار مصرف نمایید.
- ت) همراه با آب آبیاری اعم از قطره ای "بارانی" نوار تیپ از طریق منبع تغذیه که همزن داشته باشد.
- ث) همراه با آب آبیاری به روش غرق آبی از طریق شیر بشکه و درام کود.
- ۳) تقویت و بهبود خاک گلخانه ها:
- الف) بعد از شخم (گاواهن)
- ب) - مقدار مصرف: پانصد گرم (نیم کیلوگرم) برای هر یک متر مربع
- پ) - روش مصرف:
- ۱- روی سطح خاک پخش سپس با خاک مخلوط گردد
- ۲- همراه با آب آبیاری اعم از قطره ای "بارانی" نوار تیپ "زیر سطحی" غرق آبی از طریق منبع تغذیه "شیربشکه" درام کود
- ۴) روش تغذیه از طریق برگ در باغات:
- طی پنج مرحله در سال:
- الف) بهمن ماه ۱۲۰ کیلوگرم در ۱۰۰۰
- ب) اردیبهشت ماه ۶۰ کیلوگرم در ۱۰۰۰
- پ) خرداد ماه ۶۰ کیلوگرم در ۱۰۰۰
- ت) مرداد ماه ۶۰ کیلوگرم در ۱۰۰۰
- ث) مهر ماه ۶۰ کیلوگرم در ۱۰۰۰
- ۵) روش تغذیه از طریق برگ در زراعت "غلات" صیفی جات "جالیزها و سبزیجات:
- الف) ۲۰ روز قبل از پنجه زنی تا ۴۰ روز بعد از پنجه زنی ۸۰ کیلوگرم در ۱۰۰۰.