

Humic Acid

تجزیه ضمانت شده / Compounds/	
عنصر / Elements	وزنی - وزنی (w/w)
نیتروژن کل (N)	۰.۵-
پتاسیم محلول درآب (K ₂ O)	۴
هیومیک اسید (Humic Acid)	۱۲
فلوئیک اسید (Fluvic Acid)	۳

Term of consumption		
Products	Amount of consumption (L/ha) (Fertigation)	Time of Consumption
GreenHouse plants	6-12	With first irrigation,after planting repeat at an interval of 2-3 weeks
Agricultural plants	10-15	Before planting or during the first irrigation at the beginning of flowering
	5-10	A few days after each crop + harvest
Alfalfa	3-5	A few days after each crop + harvest
Rice	1 - 1/5	Before planting
	10-15	After seeding
Corn	10-15	Before planting,as soon as male inflorescence appears
Vegetables & potatoes	3-5	Along with 2nd irrigation water 1 to 3 times repetition during growing season
	10-15	Before flowering after fruit formation
Fruit trees	10-20	

This compound is very important in the production of crops due to its high potential in ecological use and regulation of nitrogen absorption and as a result of increasing the growth. The use of liquid humus and water also increases the arable ability of agricultural lands.

The effect of Humic VasterGreen Fertilizer on the root growth is so clear and dramatic that in some cases it increases the growth of the root several times.

MASTER GREEN

شرکت تولیدکننده: واستر یوشان ماد (واستر گرین)

دفتر مرکزی: تهران، جردن، خیابان ناهید شرقی، ساختمان شماره ۱۴،

تلفن: ۰۲۱-۲۶۲۹۰۰۱۲-۱۴ طبقه ۳، واحد ۷
تلفن: ۰۲۱-۳۸۲۸۲۰۰۶-۷ تلفن: ۰۲۱-۳۸۲۸۲۰۰۶-۷
کارخانه: همدان، رزن، شهرک صنعتی رزن، میدان صنعت، بلوار تلاش، کدپستی: ۶۵۱۶۶۵۸۱۵۳

Tehran Office: Unit 7, 3rd Floor, No. 14 Bldg, East-Nahid St., Africa (Jordan) Blvd. Tehran, Iran.
Hamedan Office: Unit 7, 10th Floor, Pasteur Tower, Pasteur St, Hamedan, Iran.

+98 21 26290012-14
+98 81 38282006-7

www.vastergreen.com

هیومیک اسید

دستورالعمل مصرف		
نوع گیاه	میزان مصرف (L/ha) (کود آبیاری)	زمان مصرف
گیاهان گلخانه ای	۶-۱۲	با اولین آبیاری پس از کاشت تکرار به فاصله ۳-۲ هفته
گیاهان زراعی	۱۰-۱۵	قبل از کاشت یا هنگام اولین آبیاری شروع گلدهی
	۵-۱۰	چند روز بعد از هر چین
بونسو	۳-۵	چند روز بعد از هر چین
بنج	۱ - ۱/۵	قبل از کاشت
ذرت	۱۰-۱۵	پس از انتقال نشاء به زمین
سبزیجات و سبب زمینی	۳-۵	قبل از کاشت به محض ظهور گل آذین نر
درختان میوه	۱۰-۱۵	همراه دومین آب آبیاری ۱ تا ۳ تکرار در طول فصل رشد
	۱۰-۲۰	قبل از گلدهی بعد از تشکیل میوه

مزایا و ویژگی ها:

- با کمک به دانه بندی و بهبود ساختمان خاک، از تراکم خاک های رسی می کاهد.
- در خاک های شنی ظرفیت تبادل کاتیونی را بالا می برد.
- باعث گسترش ریشه می شود.
- با تحریک فعالیت های فیزیولوژیکی گیاهان، میزان جذب مواد از خاک را افزایش می دهد.
- سرعت نقل و انتقال مواد غذایی از ریشه به برگ و میوه ها را بیشتر میکند.
- ترکیبات سازنده:** هیومات پتاسیم، هیدروکسید پتاسیم، فلوئیک اسید، مونوپتاسیم فسفات، اوره
- اختلاف پذیری:** هیومی واسترگرین با اغلب کودهای مایع، ترکیبات آفت کش و مواد بیولوژیکی قابل اختلاط است.
- هیومی واسترگرین مایع با ترکیباتی که pH=5 کمتر دارند سازگار نیست و نباید مخلوط شود.
- هیومی واسترگرین مایع را با ترکیبات کلسیم دار مخلوط نکنید.

احتیاط و هشدار:

- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
- قبل از استفاده از کود، دستورالعمل استفاده به دقت مطالعه شود.
- میزان مصرف به عوامل مختلف بستگی داشته و بر مبنای نیاز گیاه قابل تغییر می باشد.
- در صورت اختلاط با سایر کودها و سموم، ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
- شماره ثبت ماده کودی: ۵۱۵۳۳ شماره پروانه بهره برداری: ۹۳/۲۸۳۱۷
- تاریخ تولید: درج شده بر روی کالا تاریخ انقضا: سه سال پس از تولید
- سری ساخت:

حجم خالص: ۱ لیتر



1 Liter